

我們需要使用眼藥水（1% cyclopentolate 或 1% tropicamide，取決於您的視光師的臨床決定）；這將穩定眼睛聚焦狀態並擴大瞳孔。這些測試風險極小，而這些眼藥水在對幼兒和成人的視力臨床檢測中是常規使用的。

	Tropicamide 1.0% 托品卡胺 1.0% 溶液	Cyclopentolate 1.0% 環戊醇酯氫氧氯化物 1.0% 溶液
藥物效果	擴張瞳孔 短暫麻痺聚焦肌肉	擴張瞳孔 短暫麻痺聚焦肌肉
適用情況	擴張瞳孔和作更準確的眼鏡處方評估	擴張瞳孔和作更準確的眼鏡處方評估，特別是在遠視和假性近視的個案
恢復時間	4-6 小時	24 小時
注意事項	會有畏光及看近模糊的情況，建議配戴太陽眼鏡和在滴藥後12小時內避免操作器械或駕駛	會有畏光及看近模糊的情況，建議配戴太陽眼鏡和在滴藥後12小時內避免操作器械或駕駛
可能的副作用	短暫刺痛感 口乾 視力模糊 過敏反應 可能引發急性閉角型青光眼	短暫刺痛感 視力模糊 眼睛腫脹（罕見） 語無倫次, 幻覺, 失去平衡（罕見） 眼痛（罕見） 過敏反應 可能引發急性閉角型青光眼

視光師在使用眼藥水放大瞳孔前會先篩查有否不適合散瞳的禁忌症，以減少潛在風險。